

¿QUÉ ES AUVELITY?

Es un medicamento oral de venta con receta que se utiliza para tratar a adultos con trastorno depresivo mayor (TDM). Se desconoce si AUVELITY es seguro y eficaz para uso en niños.

AUVELITY no está aprobado para otros usos más allá del tratamiento del TDM. Los ingredientes de AUVELITY, bupropión y dextrometorfano, son los mismos ingredientes que se encuentran en algunos otros medicamentos aprobados para otros usos.

¿CUÁL ES LA INFORMACIÓN MÁS IMPORTANTE QUE DEBO CONOCER SOBRE?

AUVELITY y otros medicamentos antidepresivos pueden aumentar los pensamientos y acciones suicidas en algunos niños, adolescentes y adultos jóvenes, especialmente en los primeros meses de tratamiento o cuando se cambia la dosis. AUVELITY no está indicado para niños.

Debe prestar mucha atención a cualquier cambio nuevo o repentino en el estado de ánimo, la conducta, los pensamientos o los sentimientos, o a si desarrolla pensamientos o acciones suicidas. Esto es muy importante al iniciar o cambiar la dosis de un medicamento antidepresivo.

Consulte la información de seguridad importante adicional en las páginas siguientes y la <u>Ficha técnica</u> completa, incluidos el **Recuadro de advertencia** sobre pensamientos y conductas suicidas y la <u>Guía del medicamento</u>.



¿En qué se diferencia el funcionamiento de AUVELITY?

Los expertos creen que en la depresión intervienen determinadas sustancias químicas cerebrales. Si bien la forma exacta en que AUVELITY funciona para tratar la depresión no está clara, actúa sobre diversos receptores en el cerebro que afectan ciertas sustancias químicas cerebrales.



Uno de estos receptores es el receptor NMDA, que se activa por el **glutamato**, la principal señal de "activación" del cerebro. Se cree que el receptor de sigma-1 influye en la liberación de neurotransmisores, que es la forma en que las células cerebrales se comunican entre ellas.



También se cree que AUVELITY afecta otras sustancias químicas del cerebro de las que puede haber oído hablar, como la dopamina y la norepinefrina.

Debido a que AUVELITY afecta tanto a los receptores de NMDA como a los de sigma-1, actúa de manera diferente que cualquier otro antidepresivo oral.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (CONT.)

Llame a un profesional de la salud (PS) o busque ayuda de urgencia de inmediato si usted o su ser querido tiene alguno de los siguientes síntomas, especialmente si son nuevos, empeoran o le preocupan:

- pensamientos o acciones suicidas
- depresión o ansiedad nuevas o que empeoran
- agitación o inquietud
- problemas para dormir (insomnio)
- comportamiento agresivo o enfado violento
- aumento extremo de la actividad y del habla (manía)
- ataques de pánico
- irritabilidad nueva o que empeora
- comportamiento basado en impulsos peligrosos
- otros cambios inusuales en la conducta o el estado de ánimo

Consulte la información de seguridad importante adicional en las páginas siguientes y la <u>Ficha técnica</u> completa, incluidos el **Recuadro de advertencia** sobre pensamientos y conductas suicidas y la <u>Guía del medicamento</u>.



AUVELITY puede ayudar a aliviar rápidamente los síntomas de depresión.



Las personas que tomaron AUVELITY presentaron una mayor mejoría de los síntomas a las 6 semanas en comparación con las que tomaron placebo.*

AUVELITY es un antidepresivo oral de acción rápida.*

AUVELITY se estudió en un ensayo de 6 semanas en el que se comparó con un placebo.

¿Por qué AUVELITY?



Comenzó a funcionar para algunas personas en tan solo 1 semana En promedio, ya en la semana 1, las personas que tomaron AUVELITY tuvieron una mejoría rápida en sus puntuaciones de síntomas depresivos frente a quienes tomaron el placebo.*



Se redujeron las puntuaciones de depresión observadas en un estudio abierto que duró hasta 12 meses

Las puntuaciones medias de depresión se redujeron en un estudio que duró hasta 12 meses en el que tanto los investigadores como los pacientes sabían que estos tomaban AUVELITY.†

¿Qué dijeron las personas que tomaron AUVELITY?

En el estudio que comparó AUVELITY con un placebo, las personas utilizaron una escala para evaluar cómo la depresión alteraba:

- sus actividades laborales/ escolares
- su vida social
- su vida familiar/sus responsabilidades en el hogar

Las personas que tomaron AUVELITY informaron de una mejora en las puntuaciones totales a las 6 semanas frente a quienes tomaron el placebo.



Retrato del actor

*Medida frente al placebo en una escala de valoración de la depresión durante un estudio de 6 semanas de 327 adultos con TDM. La mejoría de los síntomas se basó en el cambio general en una escala de síntomas de depresión que evaluó: tristeza, tensión interna, disminución del sueño y del apetito, dificultad para concentrarse o hacer actividades cotidianas, falta de interés, falta de energía/motivación y de capacidad para sentir, pesimismo y pensamientos suicidas.

†Estudio de 609 adultos con TDM. Este estudio no se diseñó para evaluar la eficacia a largo plazo de AUVELITY. Los pacientes eran retirados del estudio al cabo de 6 semanas si no presentaban al menos una mejoría del 25 % en su puntuación de depresión. Se evaluó a 341 pacientes en el mes 9 y a 29 en el mes 12.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (CONT.)

No tome AUVELITY si:

- tiene o tuvo un trastorno convulsivo.
- tiene o tuvo un trastorno de la alimentación, como anorexia o bulimia.
- dejó de beber alcohol recientemente y de forma repentina, o tomaba medicamentos denominados benzodiazepinas, barbitúricos o medicamentos anticonvulsivos, y dejó de tomarlos recientemente de forma repentina.
- toma un inhibidor de la monoaminoxidasa (IMAO), dejó de tomar un IMAO en los últimos 14 días o recibe tratamiento con el antibiótico linezolida o el azul de metileno intravenoso. Si no está seguro de si toma un IMAO, pregúntele a su PS o farmacéutico. No empiece a tomar un IMAO hasta que haya dejado de tomar AUVELITY durante al menos 14 días.
- es alérgico al dextrometorfano, al bupropión o a cualquier otro ingrediente de AUVELITY.

Consulte la información de seguridad importante adicional en las páginas siguientes y la <u>Ficha técnica</u> completa, incluidos el **Recuadro de advertencia** sobre pensamientos y conductas suicidas y la <u>Guía del medicamento</u>.



¿Cómo tomo AUVELITY?

Tome AUVELITY exactamente como le indique su médico. Se recomienda que lo tome una vez al día durante los primeros 3 días y, a continuación, dos veces al día, con un intervalo mínimo de 8 horas. No tome más de 2 comprimidos en un plazo de 24 horas.



Antes de comenzar a tomar AUVELITY, informe a su médico sobre cualquier medicamento que tome actualmente, incluido cualquiera que contenga bupropión o dextrometorfano. Asegúrese también de proporcionar a su médico sus antecedentes médicos detallados, incluidos los antecedentes personales o familiares de trastorno bipolar, manía o hipomanía. Su médico debe medirle la presión arterial antes de que empiece a tomar AUVELITY y durante el tratamiento.



Puede tomar AUVELITY con o sin alimentos. Trague los comprimidos enteros; no los triture, divida ni mastique.



No tome más de 1 comprimido a la vez. Si omite una dosis, no tome una adicional. Tome su siguiente dosis a la hora habitual.

¿Cuáles son algunos de los posibles efectos secundarios?

Durante un estudio clínico de 6 semanas, los efectos secundarios más frecuentes presentados por el 5 % o más de las personas que tomaron AUVELITY (y al menos el doble que con el placebo) fueron: mareos, dolor de cabeza, diarrea, sensación de sueño, boca seca, problemas de la función sexual y sudoración excesiva. Estos no son todos los posibles efectos secundarios de AUVELITY.

¿Qué ocurre con los problemas sexuales y el aumento de peso?

Sabemos que pueden ser cuestiones prioritarias cuando se trata de antidepresivos. **En un estudio de 6 semanas:**



Las personas que tomaron AUVELITY adelgazaron alrededor de media libra (250 g), mientras que las que tomaron placebo aumentaraon alrededor de 1 libra (500 g), en promedio.



AUVELITY puede producir efectos secundarios sexuales. Se informaron efectos secundarios sexuales en el 6% de las personas que tomaban AUVELITY, que incluyeron disfunción eréctil, disminución de la libido y problemas con el orgasmo.*

*En general, los efectos secundarios sexuales suelen informarse poco porque las personas pueden dudar a la hora de hablar de ellos.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (CONT.)

AUVELITY puede causar efectos secundarios graves. Pregunte a su PS cómo reconocer los efectos secundarios graves que figuran a continuación y qué hacer si cree que tiene uno:

Convulsiones. Existe un riesgo de sufrir convulsiones durante el tratamiento con AUVELITY. El riesgo es mayor si toma dosis más altas de AUVELITY, si tiene ciertos problemas médicos o si toma AUVELITY con otros medicamentos. No tome AUVELITY con otros medicamentos, a menos que se lo indique su profesional de la salud.

Si sufre una convulsión durante el tratamiento con AUVELITY, deje de tomar AUVELITY y llame a su PS de inmediato. **No vuelva a tomar** AUVELITY si sufre una convulsión.

Aumentos de la presión arterial (hipertensión). Algunas personas pueden padecer presión arterial alta durante el tratamiento con AUVELITY. Su PS debe controlar su presión arterial antes de que empiece a tomar AUVELITY y durante el tratamiento.

Episodios maníacos. Las personas con trastorno bipolar que toman AUVELITY pueden presentar episodios maníacos. Los síntomas pueden incluir:

- un aumento considerable de la energía
- fuga de ideas
- ideas grandiosas inusuales
- hablar más o más rápido de lo habitual
- problemas graves para dormir
- conducta imprudente
- felicidad o irritabilidad excesiva

Mareos. AUVELITY puede causar mareos, lo que puede aumentar el riesgo de sufrir caídas.

Síndrome serotoninérgico. El síndrome serotoninérgico es un problema potencialmente mortal que puede producirse al tomar AUVELITY con otros medicamentos. Llame a su PS o acuda de inmediato al servicio de urgencias del hospital más cercano si presenta alguno de los siguientes signos y síntomas:

- agitación
- alucinaciones
- confusión
- coma
- latido cardíaco rápido
- cambios en la presión arterial
- mareos
- sudoración
- rubor

- temperatura corporal alta (hipertermia)
- sacudidas (temblores), rigidez o contracción muscular
- pérdida de la coordinación
- convulsiones
- náuseas, vómitos, diarrea

EFECTOS SECUNDARIOS FRECUENTES

Los efectos secundarios más frecuentes de AUVELITY incluyen mareos, dolor de cabeza, diarrea, sensación de sueño, boca seca, problemas de la función sexual y sudoración excesiva.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de AUVELITY. Informe a su médico si presenta algún efecto secundario. **Puede notificar los efectos secundarios llamando al 1-800-FDA-1088 o en <u>www.fda.gov/medwatch</u>.**

Consulte la información de seguridad importante adicional en las páginas siguientes y la <u>Ficha técnica</u> completa, incluidos el **Recuadro de advertencia** sobre pensamientos y conductas suicidas y la <u>Guía del medicamento</u>.

Pensamientos o conductas inusuales. Uno de los ingredientes de AUVELITY (bupropión) puede causar pensamientos o conductas inusuales, incluidos delirios (creer que es otra persona), alucinaciones (ver u oír cosas que no están ahí), paranoia (sentir que las personas están en su contra) o confusión. Si le sucede esto, llame a su PS.

Problemas oculares (glaucoma de ángulo cerrado). AUVELITY puede causar un tipo de problema ocular llamado glaucoma de ángulo cerrado en personas que padecen otras afecciones oculares. Es conveniente que se someta a un examen oftalmológico para saber si corre riesgo y, si es así, recibir tratamiento preventivo. Llame a su PS si presenta dolor ocular, cambios en la visión, o hinchazón o enrojecimiento en los ojos o alrededor de los ojos.



Con AUVELITY, ahorrar puede ser simple

Hay más de una forma de ahorrar:

Opción 1

Pagar tan solo \$0 a través de PhilRx*

PhilRx se ocupa de los detalles de modo que los pacientes que reúnen los requisitos puedan obtener el precio más bajo posible para AUVELITY. Opción 2

Pagar tan solo \$10 en su farmacia local

Los pacientes que reúnen los requisitos pueden pagar tan solo \$10 por una receta de 30 o 90 días.[†]



Retrato del actor

*PhilRx es un proveedor externo.

†Se aplican los términos y condiciones.



Visite AUVELITY.com/Save para comenzar a ahorrar



Inscríbase en AUVELITY.com/OnMySide para obtener recursos útiles y mucho más

Términos y condiciones de la tarjeta de ahorro

Términos y condiciones: al aprovechar esta oferta, el paciente certifica que entiende y cumplirá con todos los siguientes términos y condiciones y cualquier término de su contrato de seguro de salud que requiera notificación a su pagador de la existencia y/o el valor de esta oferta.

Requisitos de elegibilidad del paciente: Esta oferta es válida solo para pacientes de 18 años de edad o más que tengan una cobertura de seguro médico privado. El paciente debe tener una receta válida para comprimidos de liberación prolongada de 45 mg/105 mg de Auvelity® (dextrometorfano HBr y bupropión HCl) en el momento en que el farmacéutico la completa y la dispensa al paciente. El paciente debe tener un seguro médico privado que cubra parte del costo de AUVELITY. El paciente reside en los Estados Unidos o en territorios de los Estados Unidos según la dirección del paciente.

Restricciones importantes: Oferta no válida para recetas reembolsadas en virtud de Medicaid, un plan de beneficios de fármacos de Medicare, Tricare u otros programas de salud federales o estatales (como programas de asistencia médica). Las tarjetas de descuento en efectivo y otros planes que no corresponden al seguro no son válidos como principales en virtud de esta oferta. Oferta no válida para pacientes que pagan en efectivo. Si el paciente reúne los requisitos para recibir beneficios de fármacos en virtud de cualquiera de dichos programas, no puede aprovechar esta oferta. Esta oferta no es transferible y se limita a una oferta por persona. No es válida si se reproduce. Es nula donde lo prohíba la ley. La tarjeta de copago no puede combinarse con ningún otro tipo de ahorro, prueba gratuita u oferta similar para la receta especificada. Programa administrado por ConnectiveRx en nombre de Axsome Therapeutics, Inc. Las partes se reservan el derecho de rescindir, revocar o modificar esta oferta sin aviso en cualquier momento. El programa vence el 12/31/2025.

Para el paciente: Los pacientes elegibles pagarán tan solo \$10 por el suministro para 30 o 90 días. Para canjear esta oferta, debe tener una receta válida de comprimidos de liberación prolongada de 45 mg/105 mg de Auvelity® (dextrometorfano HBr y bupropión HCl). Siga las instrucciones de dosificación que le dé el médico. Esta oferta no puede canjearse por dinero en efectivo. Al aprovechar esta oferta, usted certifica que cumple los criterios de elegibilidad y cumplirá con los términos y condiciones descritos en la sección Restricciones. Los pacientes que tengan preguntas sobre la oferta de ahorro de Auvelity® On My Side deben llamar al 1-800-805-8621.



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (CONT.) **ANTES DE USARLO**

- Informe a su PS sobre todos los medicamentos que tome, incluidos los medicamentos de venta con receta y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.
- Es importante que informe a su PS si toma:
- otros medicamentos que contengan bupropión o dextrometorfano
- medicamentos para tratar la depresión, la ansiedad, los trastornos psicóticos o del pensamiento, incluidos los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina (ISRS) y los antidepresivos tricíclicos
- teofilina
- corticoesteroides
- medicamentos orales para la diabetes o utiliza insulina para controlar el azúcar en sangre
- medicamentos para controlar el apetito (anorexígenos)
- medicamentos con nicotina para ayudarle a dejar de fumar
- drogas de abuso (ilícitas)
- benzodiazepinas, sedantes hipnóticos (medicamentos para dormir)
- Si no está seguro de si toma alguno de estos medicamentos, pregunte a su PS. Este le podrá decir si es seguro tomar AUVELITY con sus otros medicamentos.
- Informe a su PS si está embarazada o planea quedar embarazada. AUVELITY puede causarle daño al feto si lo toma durante el embarazo. No se recomienda tomar AUVELITY durante el embarazo. El PS les recetará otro tratamiento a las mujeres que planeen quedar embarazadas.
- Uno de los ingredientes de AUVELITY pasa a la leche materna. No amamante durante el tratamiento con AUVELITY ni en los 5 días posteriores a la última dosis.

Informe a su PS sobre todas sus afecciones médicas, incluso si:

- tiene problemas de hígado o riñones.
- tiene diabetes, cardiopatía o presión arterial alta.
- tiene antecedentes de convulsiones, accidente cerebrovascular, trastorno alimentario, traumatismo craneal, o tumor en el cerebro o la médula espinal.
- tiene antecedentes de alcoholismo o drogadicción.
- tiene antecedentes de convulsiones o trastorno alimentario, o es alcohólico o drogadicto.
- tiene niveles bajos de azúcar en sangre, niveles bajos de sodio en sangre o antecedentes de caídas.
- toma otros medicamentos que podrían interactuar con AUVELITY.
- tiene o tuvo una afección conocida como trastorno bipolar, o antecedentes familiares de trastorno bipolar, suicidio o depresión.
- tiene presión alta en el ojo (glaucoma).

Revise la siguiente lista con su PS. Es posible que AUVELITY no sea adecuado para usted si:

- bebe mucho alcohol.
- abusa medicamentos de venta con receta o drogas ilícitas.
- está embarazada o planea quedar embarazada.
- está amamantando o planea amamantar.

CÓMO TOMARLO

- AUVELITY solo puede adquirirse con receta médica.
- Tome AUVELITY exactamente como le indique su PS.
- Tome AUVELITY 1 vez al día durante 3 días y, a continuación, aumente la dosis a 2 veces al día (con un intervalo mínimo de 8 horas). No tome más de 2 comprimidos de AUVELITY en 24 horas.
- Si omite una dosis, no tome una dosis adicional. Espere y tome su siguiente dosis a la hora habitual. No tome más de 1 dosis de AUVELITY a a vez.
- No cambie la dosis ni deje de tomar AUVELITY sin hablar antes con su PS.
- Trague los comprimidos de AUVELITY enteros. No triture, mastique ni divida los comprimidos.
- No le dé AUVELITY a otras personas.
 Si toma demasiado AUVELITY, llame a su PS o busque asesoramiento médico de inmediato.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN

Para obtener más información sobre AUVELITY, llame al 866-496-2976 o visite AUVELITY.com.

Este resumen proporciona información básica sobre AUVELITY, pero no incluye toda la información conocida sobre este medicamento. Lea la información que acompaña a su receta cada vez que se le dispense. Esta información no sustituye la consulta con su médico. Asegúrese de hablar con su médico u otro PS sobre AUVELITY y cómo tomarlo. Su PS es la persona más indicada para ayudarle a decidir si AUVELITY es adecuado para usted.

Consulte la Ficha técnica completa, incluidos el Recuadro de advertencia sobre pensamientos y conductas suicidas y la <u>Guía del medicamento</u>.

AUV CON BS 10/2022



Retrato del actor



